

大腸癌

2024年5月公開

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	14日	大腸癌
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
CapOX (XELOX)	カペシタビン	2000 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	大腸癌
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
BV +mFOLFOX6	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	14日	大腸癌
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
BV +CapOX (XELOX)	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	21日	大腸癌
	カペシタビン	2000 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
BV +Cap (カペシタビン)	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	21日	大腸癌

	カペシタビン	2000 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
BV +CapIRI (XELIRI)	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	21日	大腸癌
	カペシタビン	1600 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	イリノテカン	200 mg/m ²	点滴静注 90分	d1		
BV + FOLFOXIRI	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	14日	大腸癌
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注 90分	d1		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
BV +TAS102(Lonserf)	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1,15	28日	大腸癌
	トリフルリジン・ チピラシル塩酸塩 配合錠	70 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-6朝 d8夕-13朝		
ベクティビックス +mFOLFOX6	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 30分	d1	14日	大腸癌
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。