

大腸癌

2024年5月公開

2026年5月改定

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
術後補助レジメン						
CapOX (XELOX) (最大8cycle)	カペシタビン	2000 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	大腸癌
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
mFOLFOX6 (最大12cycle)	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	14日	大腸癌
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
進行再発レジメン						
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	14日	大腸癌
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
FOLFIRI	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	14日	大腸癌
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
CapOX (XELOX)	カペシタビン	2000 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	大腸癌
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
CapIRI (XELIRI)	カペシタビン	1600 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	大腸癌
	イリノテカン	200 mg/m ²	点滴静注 1.5時間	d1		

BV +mFOLFOX6	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	14日	大腸癌
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
BV +CapOX (XELOX)	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	21日	大腸癌
	カペシタビン	2000 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
BV +Cap (カペシタビン)	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	21日	大腸癌
	カペシタビン	2000 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
BV+S-1	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1,15,29	42日	大腸癌
	S-1	80 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-29朝		
BV+FOLFIRI	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	14日	大腸癌
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		

	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
BV +CapIRI (XELIRI)	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	21日	大腸癌
	カペシタビン	1600 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	イリノテカン	200 mg/m ²	点滴静注 90分	d1		
BV + FOLFOXIRI	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	14日	大腸癌
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注 90分	d1		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
BV +TAS102(Lonserf)	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1,15	28日	大腸癌
	トリフルリジン・ チピラシル塩酸塩 配合錠	70 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-6朝 d8夕-13朝		
Ramucirumab +FOLFIRI	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1	14日	大腸癌
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		

	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
Panitumumab +mFOLFOX6	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 1時間	d1	14日	大腸癌 (EGFR陽性、 Ras野生型)
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
Panitumumab +FOLFIRI	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 1時間	d1	14日	大腸癌 (EGFR陽性、 Ras野生型)
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
Panitumumab +CPT-11	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 1時間	d1	14日	大腸癌 (EGFR陽性、Ras野生型)
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注 90分	d1		
Panitumumab +Sotorasib	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 1時間	d1	14日	大腸癌 (KRAS G12C変異陽性)
	ソトラシブ	960 mg/body	1日1回 内服	連日内服		
EC+mFOLFOX6	セツキシマブ	500 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	14日	大腸癌 (BRAF V600E 変異陽性)
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
	エンコラフェニブ	300 mg/body	1日1回 内服	連日内服		
*Cetuximab +Encorafenib ± Binimetinib	セツキシマブ	500 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	14日	大腸癌 (BRAF V600E 変異陽性)
	エンコラフェニブ	300 mg/body	1日1回 内服	連日内服		
	ビニメチニブ	90 mg/body/day	1日2回 内服	連日内服		

Pertuzumab +Trastuzumab (点滴)	ペルツズマブ	初回 840 mg/body 2回目 - 420 mg/body	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日	大腸癌 (HER2陽性)
	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目 - 6mg/kg	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1		
Pertuzumab +Trastuzumab (皮下注)	フェスゴ®	初回 PER:1200 mg HER:600 mg/body 2回目 - PER:600 mg HER:600 mg/body	皮下注射 5分 (初回 8分)	d1	21日	大腸癌 (HER2陽性)

*ビニメチニブの内服の有無は患者毎に決定されます。

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。

|