大腸癌

2024年5月公開
2026年11月改定

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
術後補助レジメン						
CapOX (XELOX) （最大8cycle）	カペシタビン	2000 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝	21日	大腸癌
	オキサリプラチン	130 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
mFOLFOX6 （最大12cycle）	オキサリプラチン	85 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1	14日	大腸癌
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
進行再発レジメン						
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1	14日	大腸癌
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
FOLFIRI	イリノテカン	150 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1	14日	大腸癌
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
CapOX (XELOX)	カペシタビン	2000 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝	21日	大腸癌
	オキサリプラチン	130 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
CapIRI (XELIRI)	カペシタビン	1600 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝	21日	大腸癌
	イリノテカン	200 mg/m^2	点滴静注　1.5時間	d1		

BV +mFOLFOX6	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注　30分 （初回　90分） （2回目　60分）	d1	14日	大腸癌
	オキサリプラチン	85 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
BV +CapOX (XELOX)	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注　30分 （初回　90分） （2回目　60分）	d1	21日	大腸癌
	カペシタビン	2000 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	130 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		
BV +Cap（ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ）	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注　30分 （初回　90分） （2回目　60分）	d1	21日	大腸癌
	カペシタビン	2000 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝		
BV+S-1	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注　30分 （初回　90分） （2回目　60分）	d1,15,29	42日	大腸癌
	S-1	80 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-29朝		
BV+FOLFIRI	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注　30分 （初回　90分） （2回目　60分）	d1	14日	大腸癌
	イリノテカン	150 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		

	フルオロウラシル	400 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
BV +CapIRI (XELIRI)	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注　30分 （初回　90分） （2回目　60分）	d1	21日	大腸癌
	カペシタビン	1600 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝		
	イリノテカン	200 mg/m^2	点滴静注　90分	d1		
BV＋FOLFOXIRI	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注　30分 （初回　90分） （2回目　60分）	d1	14日	大腸癌
	イリノテカン	150 mg/m^2	点滴静注　90分	d1		
	オキサリプラチン	85 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
BV +TAS102(Lonserf)	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注　30分 （初回　90分） （2回目　60分）	d1,15	28日	大腸癌
	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合錠	70 mg/m2	1日2回　内服	d1夕-6朝 d8夕-13朝		
Ramucirumab +FOLFIRI	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注　30分 （初回　60分）	d1	14日	大腸癌
	イリノテカン	150 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		

	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
Panitumumab +mFOLFOX6	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注　1時間	d1	14日	大腸癌 （EGFR陽性、 Ras野生型）
	オキサリプラチン	85 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
Panitumumab +FOLFIRI	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注　1時間	d1	14日	大腸癌 （EGFR陽性、 Ras野生型）
	イリノテカン	150 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
Panitumumab +CPT-11	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注　1時間	d1	14日	大腸癌 （EGFR陽性、Ras野生型）
	イリノテカン	150 mg/m^2	点滴静注　90分	d1		
Panitumumab +Sotorasib	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注　1時間	d1	14日	大腸癌 （KRAS　G12C変異陽性）
	ソトラシブ	960 mg/body	1日1回　内服	連日内服		
EC+mFOLFOX6	セツキシマブ	500 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1	14日	大腸癌 （BRAF V600E 変異陽性）
	オキサリプラチン	85 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
	エンコラフェニブ	300 mg/body	1日1回　内服	連日内服		
*Cetuximab +Encorafenib ±Binimetinib	セツキシマブ	500 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1	14日	大腸癌 （BRAF V600E 変異陽性）
	エンコラフェニブ	300 mg/body	1日1回　内服	連日内服		
	ビニメチニブ	90 mg/body/day	1日2回　内服	連日内服		

Pertuzumab +Trastuzumab （点滴）	ペルツズマブ	初回 840 mg/body 2回目- 420 mg/body	点滴静注　30分 （初回　90分）	d1	21日	大腸癌 （HER2陽性）
	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目- 6mg/kg	点滴静注　30分 （初回　60分）	d1		
Pertuzumab +Trastuzumab （皮下注）	フェスゴ®	初回 PER:1200 mg HER:600 mg/body 2回目- PER:600 mg HER:600 mg/body	皮下注射　5分 （初回　8分）	d1	21日	大腸癌 （HER2陽性）

*ビニメチニブの内服の有無は患者毎に決定されます。

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。