

胃癌

2024年5月公開

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
CapOX	カペシタビン	2000 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	胃癌
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
Ramucirumab +PTX	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 60分	d1,15	28日	胃癌
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 60分	d1,8,15		
Ramucirumab +nab-PTX	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 60分	d1,15	28日	胃癌
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15		
Nivolumab +SOX	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	胃癌
	S-1	80 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	100 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
Trastuzumab +SOX	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回8 mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日	胃癌
	S-1	80 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	100 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。