

胃癌

2024年5月公開

2026年5月改定

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
術後補助レジメン						
CapOX (最大8cycle)	カペシタビン	2000 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	胃癌
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
S-1+DTX (最大6cycle)	S-1	80 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	胃癌
	ドセタキセル	40 mg/m ²	点滴静注 60分	d1		
進行再発レジメン						
SOX	S-1	80 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	胃癌
	オキサリプラチン	100 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
CapOX	カペシタビン	2000 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝	21日	胃癌
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	14日	胃癌
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
Ramucirumab +nab-PTX	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 60分	d1,15	28日	胃癌
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15		
SOX +Trastuzumab	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回8 mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日	胃癌
	S-1	80 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	100 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		

SOX +Trastuzumab +Pembrolizumab	ペンブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	胃癌
	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回8 mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1		
	S-1	80 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	100 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
CapOX +Trastuzumab +Pembrolizumab	ペンブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	胃癌
	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回8 mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1		
	カペシタビン	2000 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
Trastuzumab Deruxtecan	トラスツズマブ デルクステカン	6.4 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日	胃癌
SOX +Nivolumab	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	胃癌
	S-1	80 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	100 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
mFOLFOX6 +Nivolumab	ニボルマブ	240 mg/m ²	点滴静注 30分	d1	14日	胃癌
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		
SOX +Pembrolizumab	ペンブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	胃癌
	S-1	80 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	100 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		

CapOX +Pembrolizumab	ペンブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	胃癌
	カペシタビン	2000 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
CapOX +Zolbetuximab	ゾルベツキシマブ	初回800mg/m ² 2回~600mg/m ²	点滴静注 2時間以上	d1	21日	胃癌
	カペシタビン	2000 mg/m ²	1日2回 内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
mFOLFOX6 +Zolbetuximab	ゾルベツキシマブ	初回800mg/m ² 2回~400mg/m ²	点滴静注 2時間以上	d1	14日	胃癌
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1		

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。