胃癌

2024年5月公開
2026年11月改定

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
術後補助レジメン						
CapOX （最大8cycle）	カペシタビン	2000 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝	21日	胃癌
	オキサリプラチン	130 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
S-1+DTX （最大6cycle）	S-1	80 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝	21日	胃癌
	ドセタキセル	40 mg/m^2	点滴静注　60分	d1		
術前・術後補助レジメン						
術前D-FLOT （最大2cycle）	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注　1時間	d1	28日	胃癌
	ドセタキセル	50 mg/m^2	点滴静注　1時間	d1,15		
	オキサリプラチン	85 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1,15		
	レボホリナート	100 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1,15		
	フルオロウラシル	2600 mg/m^2	点滴静注　24時間	d1,15		
術後D-FLOT （最大2cycle）	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注　1時間	d1	28日	胃癌
	ドセタキセル	50 mg/m^2	点滴静注　1時間	d1,15		
	オキサリプラチン	85 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1,15		
	レボホリナート	100 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1,15		
	フルオロウラシル	2600 mg/m^2	点滴静注　24時間	d1,15		
Durvalumab(維持) （最大10cycle）	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注　1時間	d1	28日	胃癌
進行再発レジメン						
SOX	S-1	80 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝	21日	胃癌
	オキサリプラチン	100 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		

CapOX	カペシタビン	2000 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝	21日	胃癌
	オキサリプラチン	130 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1	14日	胃癌
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
Ramucirumab +nab-PTX	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注　60分	d1,15	28日	胃癌
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m^2	点滴静注　30分	d1,8,15		
SOX +Trastuzumab	トラスツズマブ	6 mg/kg （初回8 mg/kg）	点滴静注 30分 （初回　90分）	d1	21日	胃癌
	S-1	80 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	100 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
SOX +Trastuzumab +Pembrolizumab	ペンブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注　30分	d1	21日	胃癌
	トラスツズマブ	6 mg/kg （初回8 mg/kg）	点滴静注 30分 （初回　90分）	d1		
	S-1	80 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	100 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
CapOX +Trastuzumab +Pembrolizumab	ペンブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注　30分	d1	21日	胃癌
	トラスツズマブ	6 mg/kg （初回8 mg/kg）	点滴静注 30分 （初回　90分）	d1		
	カペシタビン	2000 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	130 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		

Trastuzumab Deruxtecan	トラスツズマブ デルクステカン	6.4 mg/kg	点滴静注 30分 （初回　90分）	d1	21日	胃癌
SOX +Nivolumab	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注　30分	d1	21日	胃癌
	S-1	80 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	100 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
mFOLFOX6 +Nivolumab	ニボルマブ	240 mg/m^2	点滴静注　30分	d1	14日	胃癌
	オキサリプラチン	85 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
SOX +Pembrolizumab	ペンブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注　30分	d1	21日	胃癌
	S-1	80 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	100 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
CapOX +Pembrolizumab	ペンブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注　30分	d1	21日	胃癌
	カペシタビン	2000 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	130 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
CapOX +Zolbetuximab	ゾルベツキシマブ	初回800mg/m^2 2回～600mg/m^2	点滴静注 2時間以上	d1	21日	胃癌
	カペシタビン	2000 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝		
	オキサリプラチン	130 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
mFOLFOX6 +Zolbetuximab	ゾルベツキシマブ	初回800mg/m^2 2回～400mg/m^2	点滴静注 2時間以上	d1	14日	胃癌
	オキサリプラチン	85 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		

	フルオロウラシル	400 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。
※最新の情報と異なる場合があります。