

# 胆道癌、膵癌

2024年5月公開

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8,15	28日	膵癌
Durvalumab +GEM + CDDP	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注 60分	d1	21日	胆道癌
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8		
	シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1,8		
GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8,15	28日	膵癌
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	125 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8,15		
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1	14日	膵癌
	イリノテカン	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	d1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46時間	d1		

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。