

# 胆道癌、膵癌

2024年5月公開

2025年6月改定

| レジメン名           | 一般名                 | 投与量                    | 投与時間                              | 投与日     | サイクル期間 | 適用  |
|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------|--------|-----|
| Atezolizumab+BV | アテゾリズマブ             | 1200 mg/body           | 点滴静注 30分<br>(初回 60分)              | d1      | 21日    | 肝癌  |
|                 | ベバシズマブ              | 15 mg/kg               | 点滴静注 30分<br>(初回 90分)<br>(2回目 60分) | d1      |        |     |
| GEM             | ゲムシタビン              | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 30分                          | d1,8,15 | 28日    | 膵癌  |
| GEM+S-1         | ゲムシタビン              | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 30分                          | d1,8    | 21日    | 膵癌  |
|                 | S-1                 | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 1日2回 内服                           | d1夕-15朝 |        |     |
| GEM+nab-PTX     | ゲムシタビン              | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 30分                          | d1,8,15 | 28日    | 膵癌  |
|                 | アルブミン懸濁型<br>パクリタキセル | 125 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 30分                          | d1,8,15 |        |     |
| FOLFIRINOX      | オキサリプラチン            | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 2時間                          | d1      | 14日    | 膵癌  |
|                 | イリノテカン              | 180 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 90分                          | d1      |        |     |
|                 | レボホリナート             | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 2時間                          | d1      |        |     |
|                 | フルオロウラシル            | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 5分                           | d1      |        |     |
|                 | フルオロウラシル            | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 46時間                         | d1      |        |     |
| FF+nallRI       | リボソーマルイリノテカン        | 70 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 90分                          | d1      | 14日    | 膵癌  |
|                 | レボホリナート             | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 2時間                          | d1      |        |     |
|                 | フルオロウラシル            | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 46時間                         | d1      |        |     |
| GEM             | ゲムシタビン              | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 30分                          | d1,8,15 | 28日    | 胆道癌 |
| GEM+S-1         | ゲムシタビン              | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 30分                          | d1,8    | 21日    | 胆道癌 |

| レジメン                                      | S-1      | 60 mg/m <sup>2</sup>   | 1日2回 内服  | d1夕-15朝 | 21日 | 胆道癌 |
|---|----------|------------------------|----------|---------|-----|-----|
| Durvalumab<br>+GEM +CDDP<br>(最大8cycle)    | デュルバルマブ  | 1500 mg/body           | 点滴静注 60分 | d1      | 21日 | 胆道癌 |
|   | ゲムシタビン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 30分 | d1,8    |     |     |
|   | シスプラチン   | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 60分 | d1,8    |     |     |
| Durvalumab                                | デュルバルマブ  | 1500 mg/body           | 点滴静注 60分 | d1      | 28日 | 胆道癌 |
| Pembrolizumab<br>+GEM +CDDP<br>(最大8cycle) | ペンブロリズマブ | 200 mg/body            | 点滴静注 30分 | d1      | 21日 | 胆道癌 |
|   | ゲムシタビン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 30分 | d1,8    |     |     |
|   | シスプラチン   | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 60分 | d1,8    |     |     |
| Pembrolizumab<br>+GEM                     | ペンブロリズマブ | 200 mg/body            | 点滴静注 30分 | d1      | 21日 | 胆道癌 |
|   | ゲムシタビン   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 30分 | d1,8    |     |     |

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。

※最新の情報と異なる場合があります。