肝癌、胆道癌、膵癌

2024年5月公開
2026年11月改定

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	サイクル期間	適用
Atezolizumab+BV	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注　30分 （初回　60分）	d1	21日	肝癌
	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注　30分 （初回　90分） （2回目　60分）	d1		
GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m^2	点滴静注　30分	d1,8,15	28日	膵癌
GEM+S-1	ゲムシタビン	1000 mg/m^2	点滴静注　30分	d1,8	21日	膵癌
	S-1	60 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝		
GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	1000 mg/m^2	点滴静注　30分	d1,8,15	28日	膵癌
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	125 mg/m^2	点滴静注　30分	d1,8,15		
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1	14日	膵癌
	イリノテカン	180 mg/m^2	点滴静注　90分	d1		
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m^2	点滴静注　5分	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
FF+nalIRI	リポソーマルイリノテカン	70 mg/m^2	点滴静注　90分	d1	14日	膵癌
	レボホリナート	200 mg/m^2	点滴静注　2時間	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m^2	点滴静注　46時間	d1		
GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m^2	点滴静注　30分	d1,8,15	28日	胆道癌
GEM+S-1	ゲムシタビン	1000 mg/m^2	点滴静注　30分	d1,8	21日	胆道癌

GEM+S-1	S-1	60 mg/m^2	1日2回　内服	d1夕-15朝	21日	胆道癌
Durvalumab +GEM＋CDDP (最大8cycle)	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注　60分	d1	21日	胆道癌
	ゲムシタビン	1000 mg/m^2	点滴静注　30分	d1,8		
	シスプラチン	25 mg/m^2	点滴静注　60分	d1,8		
Durvalumab	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注　60分	d1	28日	胆道癌
Pembrolizumab +GEM＋CDDP (最大8cycle)	ペンブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注　30分	d1	21日	胆道癌
	ゲムシタビン	1000 mg/m^2	点滴静注　30分	d1,8		
	シスプラチン	25 mg/m^2	点滴静注　60分	d1,8		
Pembrolizumab +GEM	ペンブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注　30分	d1	21日	胆道癌
	ゲムシタビン	1000 mg/m^2	点滴静注　30分	d1,8		

※外来での使用頻度が高いレジメンを中心に載せています。
※最新の情報と異なる場合があります。