




# 【S-1+CBDCA 療法について】

## (S-1+カルボプラチン)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール**(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1錠 (エヌケーエスワン)	抗がん剤です	朝・夕 内服	●	●●	●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●						
グラニセトロン注 デキサメタゾン注 (デキサート)	吐き気止めです	15分	💧																				
カルボプラチン注	抗がん剤です	1時間30分	💧																				
生理食塩液		15分	💧																				



😊 **治療による副作用** :副作用が出やすい時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																							
	皮疹																							
	皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。																							
	下痢																							
	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。																							
口内炎																								
口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																								
色素沈着																								
肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																								
流涙(涙目、涙が出る)																								
涙が止まらない、目が痛い、目がかすむ、物が見えにくい等があるときはお知らせ下さい。																								
検査値	白血球減少																							
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																							
	赤血球減少(貧血)																							
貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																								
血小板減少																								
出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																								

上記以外の症状でも気になる症状がありましたらお知らせ下さい。



- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。  
名古屋市立西部医療センター薬剤科(代表)052-991-8121