



# 【BV+FOLFIRI 療法について】

(ベバシズマブ+フルオロウラシル+レボホリナート+イリノテカン)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前                              | 作用                 | めやすの時間 | 1日目 | 2                      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------------------------|--------------------|--------|-----|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| パロノセトロン注(アロキシ)<br>デキサメタゾン注(デキサート) | 吐き気止めです            | 15分    |     |                        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ベバシズマブ注(アバステン)                    | 抗がん剤です             | 90分    |     | 2回目から点滴時間が短くなる場合があります。 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| イリノテカン注                           | 抗がん剤です             | 2時間    |     |                        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| レボホリナート注                          | フルオロウラシルの効果を強める薬です |        |     |                        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| フルオロウラシル注                         | 抗がん剤です             | 15分    |     |                        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| フルオロウラシル注(持続)                     | 抗がん剤です             | 46時間   |     |                        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |



この週はお休みです。

## 😊 治療による副作用

|      | 1日目             | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|
| 自覚症状 | 過敏症             | 痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。                         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
|      | 食欲不振・吐き気        | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。                        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
|      | 口内炎             | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。                        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
|      | 下痢              | 便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。                           |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
|      | 色素沈着            | 肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。                         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
|      | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) | 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。                    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
| 検査値  | 白血球減少           | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
|      | 赤血球減少(貧血)       | 貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。                                  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |
|      | 血小板減少           | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。              |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



\* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。  
 \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。  
 \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。  
 \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。  
 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター薬剤部(代表)052-991-8121