



## 【CMF 療法について】

(シクロホスファミド+メトトレキサート+フルオロウラシル)



☺ お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シクロホスファミド錠 (エンドキサン)	抗がん剤です	1日1回 内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
デキサメタゾン注 (デキサート)	吐き気止めです	15分	■							■																				
メトレキサート注 (メソトレキセート)	抗がん剤です	15分	■							■																				
フルオロウラシル注	抗がん剤です	30分	■							■																				
生理食塩液		15分	■							■																				

この週は  
お休みです。

この週は  
お休みです。

## ☺ 治療による副作用

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
自覚症状	食欲不振・吐き気																											
	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																											
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																											
	口内炎																											
	色素沈着																											
検査値	白血球減少																											
	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																											
	赤血球減少(貧血)																											
	血小板減少																											
	肝機能低下																											



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したもので、必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。