



**【PER+DTX(75)+HER3週毎療法について】** (初回)  
(ペルツズマブ+ドセタキセル+トラスズマブ)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前             | 作用              | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|------------------|-----------------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| デキサメタゾン注 (デキサート) | むくみや吐き気を抑えるお薬です | 15分    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ペルツズマブ注 (パージェタ)  | 抗がん剤です          | 60分    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| トラスズマブ注 (ハーセプチン) | 抗がん剤です          | 90分    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ドセタキセル注          | 抗がん剤です          | 60分    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 生理食塩液            |                 | 15分    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| デキサメタゾン錠 (デカドロン) | むくみや吐き気を抑えるお薬です | 朝・夕食後  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ファモチジンOD錠        | 胃薬です            | 朝・夕食後  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

特に問題がなければ、2回目以降は30分で点滴します。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

夕食後～

1回1錠

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

|                 |   | 1日目   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 自覚症状            | アレルギー様症状  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                 |   | 発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                 | 食欲不振・吐き気  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                 |   | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                 | 口内炎   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                 |   | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                 | 下痢  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                 | 便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水のような便が出る場合はお知らせ下さい。        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 発疹              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                 | 皮膚に痒みや発赤などの症状が出た場合はお知らせ下さい。                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 筋肉痛             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                 | 筋肉に痛みを感じるがあります。痛みがつかいと感ずるときはお知らせ下さい。              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 手足のしびれ          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                 | 手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                 | 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 検査値             | 白血球減少   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                 |   | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

手や足のむくみ(治療回数が増えると生じることがあります。気になる症状がありましたらお知らせ下さい。)  
爪の変化(爪の変色、爪の周囲が赤くなったり痛いなどの症状がありましたらお知らせ下さい。)  
心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- \* 感染症や口内炎を防ぐため、うがいをし、口の中を清潔に保ちましょう。
- \* 37.5度以上の発熱がある場合は、**抗生剤(レボフロキサシン)**を内服して下さい。内服を開始したら、熱が下がっても継続して服用して下さい。症状が改善しない場合は、すぐに主治医に連絡して下さい。