



【R-CVP療法について】 (リツキシマブ+シクロホスファミド+ビンクリスチン+プレドニゾン)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
アセトアミノフェン錠(カロナール)	アレルギー様症状を抑える薬です	1日1回 内服	☉	☉																				☉
ジフェンヒドラミン錠(レスタミン)		1日1回 内服	☉	☉																				☉
リツキシマブ注	抗がん剤です	3~6時間	📌																					📌
グラニセトン注	吐き気止めです	15分		📌																				📌
ビンクリスチン注(オンコビン)	抗がん剤です	数分		📌																				
シクロホスファミド注(エンドキサン)	抗がん剤です	2時間		📌																				
プレドニゾン錠	ステロイドです	朝・昼 内服		☉	☉	☉	☉	☉																

この週はお休みです。

この週はお休みです。

胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。免疫が低下しますので、手洗い・うがいを心がけましょう。

朝10錠、昼10錠

:注意が必要な時期

😊 **治療による副作用**

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	アレルギー様症状																						
	食欲不振・吐き気																						
	不眠																						
	胃の不快感																						
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																						
	口内炎																						
	便秘																						
	発熱																						
	手足のしびれ																						
検査値	白血球減少																						
	赤血球減少(貧血)																						
	血小板減少																						



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
 * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。
 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター薬剤部(代表)052-991-8121