



【BD(寛解導入)皮下注 療法について】 (ボルテゾミブ+デキサメタゾン)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ注 (ベルケイド)	抗がん剤です	数分																	この週はお休みです。				
デキサメタゾン錠 (レナデックス)	ステロイドです	朝 内服																					

1回5錠

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
食欲不振・吐き気																							食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。
倦怠感																							疲れ、脱力感などを感じたときは無理をせず、体を休めてください。
便秘																							水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。
下痢																							便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水のような便が出る時はお知らせ下さい。
手足のしびれ																							手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出る場合があります。
検査値	白血球減少																						感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。
	血小板減少																						出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかりませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 咳・息切れ・息苦しさ ●心臓・血管への影響(高血圧、胸の圧迫感、足のむくみ)
- 帯状疱疹(皮膚のチクチクするような痛みから始まる発疹・水ぶくれ)
- その他の副作用・・・発疹・皮疹、貧血、不眠 など



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター薬剤部(代表)052-991-8121