



【DKd療法について】

(ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アセトアミノフェン錠 (カロナール)	アレルギー様 症状を抑える 薬です	1日1回 内服	📄	📄						📄							📄							📄						
ジフェンヒドラミン錠 (レスタミン)		1日1回 内服	📄	📄						📄							📄							📄						
デキサメタゾン錠 (カロナール)	ステロイドです	朝食後	📄	📄						📄	📄						📄	📄						📄	📄					
グラニセトン注	吐き気止めです	15分	📄							📄							📄													
ブドウ糖注	洗い流し用です	15分	📄							📄							📄													
カルフィルゾミブ注 (カイプロリス)	抗がん剤です	30分	📄							📄							📄													
ブドウ糖注	洗い流し用です	15分	📄							📄							📄													
ダラツムマブ皮下注 (ダラキューロ)	抗がん剤です	数分	📄							📄							📄							📄						

😊 治療による副作用

📄 : 注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アレルギー様症状	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																											
発熱	悪寒、発熱があるときはお知らせください。																											
食欲不振・吐き気	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																											
倦怠感	疲れ、脱力感などを感じたときは無理をせず、体を休めてください。																											
便秘・下痢	【便秘】水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良く、お知らせ下さい。【下痢】便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る場合はお知らせ下さい。																											
高血圧	血圧が高い状態が続くことがあります。血圧を測りましょう。血圧が急激に上昇する・頭痛・動悸・耳鳴りなどの症状が現れた時には緊急対応が必要になります。																											
白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いうがいをご心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																											
赤血球減少(貧血)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																											
血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、菌ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																											

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

●咳・息切れ・息苦しさ ●動悸・胸の痛み・息切れ

その他の副作用・・・腎機能障害(尿量が減る・尿が出にくい・むくみなど)、不眠、しびれなど



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター薬剤部(代表)052-991-8121