



**【AC 療法について】**  
(ドキシルピシン+シクロホスファミド)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ホスネツピタント注 (アロカリス) パロノセトロン注 (アロキシ) デキサメタゾン注 (デキサート)	吐き気止めです	30分																						
ドキシルピシン注	抗がん剤です	5分		尿の色が赤くなることがあります。								この週はお休みです。					この週はお休みです。							
シクロホスファミド注 (エンドキサン)	抗がん剤です	30分																						
生理食塩液		15分																						
デキサメタゾン錠 (デカドロン)	吐き気止めです	朝・夕食後		1回1錠																				
メクロプラミド錠	吐き気止めです	朝昼夕食前		夕食前~																				
ファモチジンOD錠	胃薬です	朝夕食後		夕食後~																				
センノシド錠	便秘薬です	寝る前		翌日からは症状に応じて服用																				

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
自覚症状	食欲不振・吐き気																						
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																						
	口内炎																						
	色素沈着																						
	脱毛(頭髮・まつ毛・眉毛など)																						
検査値	白血球減少																						
	赤血球減少(貧血)																						
	血小板減少																						

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- \* 感染症や口内炎を防ぐために、口の中を清潔に保つ必要があります。うがいを行って下さい。
- \* 37.5度以上の発熱がある場合は、**抗生剤(レボフロキサシン)**を内服して下さい。内服を開始したら1週間継続して服用して下さい。症状が数日経っても改善しない場合は、すぐに主治医に連絡して下さい。