




【GEM3投1休(胆) 療法について】 (ゲムシタピン)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール**(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
デキサメタゾン注 (デキサート)	吐き気止めです	30分	☺							☺							☺														
ゲムシタピン注	抗がん剤です	30分	☺							☺							☺														
生理食塩液		15分	☺							☺							☺														



😊 治療による副作用

☺ : 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
自覚症状	過敏症	☺							☺							☺														
	発熱	☺	☺	☺					☺	☺	☺					☺	☺	☺												
	食欲不振・吐き気	☺	☺	☺					☺	☺	☺					☺	☺	☺												
	血管痛・静脈炎	☺	☺	☺					☺	☺	☺					☺	☺	☺												
検査値	白血球減少															☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
	赤血球減少(貧血)															☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
	血小板減少															☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
	肝障害			☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター薬剤部(代表)052-991-8121