



# 【CHOP療法について】

(シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチン+プレドニゾロン)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
グラニセトン注	吐き気止めです	30分																						
ビンクリスチン注(オンコビン)	抗がん剤です	数分																						
ドキソルビシン注	抗がん剤です	30分																						
シクロホスファミド注(エンドキサン)	抗がん剤です	2時間																						
生理食塩液	ルートの洗い流し	15分																						
プレドニゾロン錠	ステロイドです	朝・昼 内服																						

尿が赤くなることがあります。

この週はお休みです。

この週はお休みです。

朝10錠、昼10錠

胃を荒らすことがありますので胃薬も一緒に飲みます。免疫が低下しますので、手洗いうがいを心がけましょう。

😊 **治療による副作用**

:注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																						
	不眠																						
	胃の不快感																						
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																						
	口内炎																						
	便秘																						
	発熱																						
	手足のしびれ																						
検査値	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																						
	白血球減少																						
	赤血球減少(貧血)																						
血小板減少																							

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。  
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター薬剤部(代表)052-991-8121