




【CPT-11(肺) 療法について】 (イリノテカン)



☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
グラニセトン注 デキサメタゾン注 (デキサート)	吐き気止めです	15分	☺							☺							☺													
イリノテカン注	抗がん剤です	1時間30分	☺							☺							☺													
生理食塩液		15分	☺							☺							☺													



☺ 治療による副作用

☺ : 注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
自覚症状	過敏症							☺							☺														痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。
	食欲不振・吐き気							☺							☺														食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。
	下痢							☺							☺														便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水のような便が出る時はお知らせ下さい。
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)														☺														髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。
検査値	白血球減少														☺														感染しやすくなりますので、手洗いうがいを中心に行いましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。
	赤血球減少(貧血)														☺														貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。
	血小板減少														☺														出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター薬剤部(代表)052-991-8121