



【BD(維持)皮下注 療法について】 (ボルテゾミブ+デキサメタゾン)



お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
ボルテゾミブ注 (ペルケイド)	抗がん剤です	数分	針						針							針							針														
デキサメタゾン錠 (レナデックス)	ステロイドです	朝 内服	錠	錠	錠	錠	1回5錠																														

治療による副作用

自覚症状	食欲不振・吐き気	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		: 注意が必要な時期																																		
	食欲不振・吐き気																																			
	便秘																																			
	下痢																																			
	手足のしびれ																																			

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかつていませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

●咳・息切れ・息苦しさ ●心臓・血管への影響(高血圧、胸の圧迫感、足のむくみ)

●帯状疱疹(皮膚のチクチクするような痛みから始まる発疹・水ぶくれ)

その他の副作用… 発疹・皮疹、貧血、不眠 など



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したもので、必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター薬剤部(代表)052-991-8121