



【PTX(80)毎週 療法について】 (パクリタキセル)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ジフェンヒドラミン錠 (レスタミン)	過敏症を抑えるお薬です	1日1回 内服	○							○							○							○						
グラニセトロン注	吐き気止めです	30分																												
ファモチジン注 (ガスター)	過敏症を抑えるお薬です		☒							☒							☒							☒						
デキサメタゾン注 (デキサート)																														
パクリタキセル注	抗がん剤です	60分	☒							☒							☒							☒						
生理食塩液		15分	☒							☒							☒							☒						

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
過敏症																													
食欲不振・吐き気																													
関節痛・筋肉痛																													
口内炎																													
手足のしびれ																													
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																													
検査値	白血球減少																												
	赤血球減少(貧血)																												
	血小板減少																												



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター薬剤部(代表)052-991-8121